

OrthoPrax Wrist Brace 3807



Dear customer,

please read through these instructions for use carefully.
If you have any questions, please contact your doctor or medical retailer.

EN

Intended purpose

The OrthoPrax Wrist Brace 3807 is a medical device. It is an orthosis for immobilizing the wrist, combined with a thumb immobilizer.

Indications

- Acute, post-traumatic and post-operative irritation and injuries of the wrist, carpal area and thumb ray
- Pre-operative care
- Tenosynovitis
- Osteoarthritis of the first carpometacarpal joint
- Immobilization following nerve lesions
- Carpal tunnel syndrome

Risks of using this product

- Please closely observe the specifications in these instructions for use and the instructions given by the specialist.
- Once you have been prescribed the OrthoPrax Wrist Brace 3807, only use it according to your indication and any additional instructions given by a medical specialist². Please consult a specialist or your physician if you want to use it together with other products. Do not modify the product yourself in any way; otherwise it may not help as expected or it may be harmful to your health. In these cases, any warranty or liability claims will be excluded.
- Avoid contact with ointments, lotions, or substances containing grease or acids.
- Any aids applied externally to the body may, if tightened excessively, lead to local pressure points or, in rare cases, constrict the underlying blood vessels or nerves.
- If you notice any changes or an increase in symptoms while wearing the product, stop any further use and contact your doctor.

Contraindications

Hypersensitive reactions harmful to health have not been reported to date. In the following conditions such aids should only be fitted and applied after consultation with your medical provider:

- Skin disorders / injuries in the relevant part of the body, particularly if inflammation is present. Likewise, any raised scars with swelling, redness and excessive heat build-up.
- Varicose veins (varicosis)
- Impaired sensation in the arm due to neurological abnormalities
- Circulatory disorders of the arm (e.g. in cases of diabetes mellitus)
- Impaired lymphatic drainage and soft tissue swelling of unknown origin

Application instructions

Putting on and taking off the OrthoPrax Wrist Brace 3807

1. Unfasten the Velcro and open the orthosis wide.
2. Insert your hand into the orthosis up until the thumb strap.
3. Using the laces, tighten the strap and fasten the Velcro on the orthosis.
4. If needed, retighten the thumb strap.

Cleaning instructions

Wash the product by hand. Never expose your product to direct heat / cold. Also observe the washing symbols in the instructions for use.

General information for specialists

Before putting on the orthosis, ensure the correct fit of the metal splints. Resize if needed. Verify the correct angle of the thumb joint, which you can adjust using the inner splint. Instruct the patient how to put on the orthosis correctly.

Notes on reuse

This product is intended to be fitted to one patient only.

Warranty

The statutory regulations of the country of purchase apply. Please first contact the retailer from whom you obtained the product directly in the event of a potential claim under the warranty. The product must be cleaned before submitting it in case of warranty claims. Warranty may be limited or excluded if the instructions on how to handle and care for the OrthoPrax Wrist Brace 3807 have not been observed. Warranty is excluded if:

- The product was not used according to the indication
- The instructions given by the specialist were not observed
- The product was modified arbitrarily

Duty to report

Due to regional legal regulations, you are required to immediately report any serious incident involving the use of this medical device to both the manufacturer and the responsible authority. Our contact details can be found on the back of this brochure.

Disposal

Once you have finished using the product, please dispose of it according to local specifications.

Material content

Nylon; Polyester (PES); Aluminium (Al); PU foam

 – Medical Device

 – DataMatrix Unique Device Identifier UDI

* A specialist is any person who is authorized, according to their state's regulations, to fit supports and orthoses and provide instructions on how to use them.

Utilisation

L'OrthoPrax Wrist Brace 3807 est un dispositif médical. Il s'agit d'une orthèse d'immobilisation du poignet associée à une attelle de pouce.

Indications

- États inflammatoires aigus, post-traumatiques et post-opératoires et lésions du poignet, du carpe et de la selle du pouce
- Applications pré-opératoires
- Tendovaginite
- Rhizarthrose
- Immobilisation à la suite d'une lésion nerveuse
- Syndrome du canal carpien

Risques d'utilisation

- Veuillez suivre méticuleusement les indications de la présente notice d'utilisation ainsi que les remarques du professionnel formé.
- À la suite de la prescription d'une OrthoPrax Wrist Brace 3807, veuillez utiliser exclusivement cette orthèse dans le respect des indications et conformément aux autres consignes fournies par les professionnels formés* de la santé. En cas d'utilisation concomitante d'autres produits, veuillez consulter préalablement un professionnel formé ou votre médecin. N'effectuez vous-même aucun changement sur le dispositif médical ; autrement, le dispositif médical ne vous apportera pas le bénéfice patient escompté ou pourrait entraîner des effets néfastes sur la santé. En pareil cas, la garantie et notre responsabilité seraient exclues
- Évitez tout contact avec des substances grasses ou acides, des crèmes ou des lotions.
- Toutes les aides thérapeutiques positionnées sur les différentes parties du corps peuvent conduire à des pressions locales excessives si elles sont portées trop serrées, et plus rarement à un rétrécissement du calibre des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Évitez de trop serrer lors de la mise en place de la sangle.
- Si, lors du port du dispositif médical, vous constatez un quelconque changement ou des troubles progressifs, stoppez son utilisation et adressez-vous à votre médecin.

Contra-indications

Aucun effet secondaire de caractère pathologique n'est connu. En présence des affections citées ci-après, l'application du produit doit être précédée d'une consultation médicale :

- Dermatoses / lésions cutanées dans la zone en contact avec l'orthèse, notamment en cas d'inflammations: cicatrices avec gonflement, rougeur et hyperthermie.
- Varices (varicosités)
- Troubles de la sensibilité au niveau du bras en raison d'altérations neurologiques
- Troubles de la circulation sanguine au niveau du bras (par ex., en cas de diabète sucré)
- Troubles de la circulation lymphatique et tumeurs inexpliqués

Conseils d'utilisation

Enfilage et retrait de l' OrthoPrax Wrist Brace 3807

1. Desserrez la bande auto-agrippante et ouvrez l'orthèse en grand.
2. Placez la main dans l'orthèse jusqu'à l'attache pour pouce.
3. Serrez la sangle au niveau des lacets et fermez à l'aide de la bande auto-agrippante de l'orthèse.
4. Si besoin, resserrez l'attache pour pouce.

Conseils de nettoyage

Veuillez laver le dispositif à la main. Ne jamais exposer votre dispositif à une source de chaleur / froid direct. Veuillez tenir compte des symboles de lavage présents dans la notice d'utilisation.

Informations générales destinées aux professionnels formés

Avant la mise en place, contrôlez l'ajustement des glissières métalliques et adaptez-les le cas échéant. Assurez-vous alors que l'angle de l'articulation du pouce est bon et qu'il s'adapte à la glissière intérieure.

Expliquez et montrez au patient comment placer correctement l'orthèse.

Conseils pour une réutilisation

Ce dispositif est réservé à la prise en charge individuelle d'un seul patient ou d'une seule patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays où le produit a été acheté. Si un cas de garantie est présumé, veuillez vous adresser premièrement à la personne à qui vous avez acheté le produit. Le produit doit être nettoyé avant de notifier un cas de garantie. En cas de non-respect des indications sur le maniement et l'entretien de la OrthoPrax Wrist Brace 3807, la garantie peut être compromise, voire devenir nulle et non avenue. La garantie est caduque dans les cas suivants :

- Utilisation non conforme aux indications
- Non-respect des consignes du professionnel formé
- Altération arbitraire du produit

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur à l'échelle régionale, il vous incombe de signaler immédiatement, aussi bien au fabricant qu'aux autorités compétentes, tout incident grave lié à l'utilisation de ce produit médical. Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de cette brochure.

Destruction

À la fin de sa durée d'utilisation, veuillez mettre le produit au rebut conformément aux réglementations locales.

Composition

Nylon, Polyester (PES), Aluminium (Al), mousse PU

 – Medical Device (Dispositif médical)

 – Identifiant de la matrice de données comme UDI

* Un professionnel formé est une personne qui est formée à l'utilisation des orthèses actives et orthèses de stabilisation conformément aux réglementations nationales en vigueur dans chaque pays concernant l'adaptation et la mise en place de ce type de produit.

Ámbito de aplicación

OrthoPrax Wrist Brace 3807 es un producto médico. Es una ortesis para la inmovilización de la muñeca en combinación con una fijación del pulgar.

Indicaciones

- Estados inflamatorios agudos, postraumáticos y posoperatorios y lesiones de la muñeca, el carpo y la base del pulgar
- Preoperatorio
- Tendovaginitis
- Rizartrosis
- Inmovilización tras una lesión nerviosa
- Síndrome del túnel carpiano

Riesgos de la aplicación

- Observe cuidadosamente as especificações destas instruções de utilização e das indicações do pessoal técnico.
- Tras la prescripción de OrthoPrax Wrist Brace 3807, úselo exclusivamente conforme a las indicaciones y observando las demás indicaciones del personal sanitario competente*. En caso de utilizarse simultáneamente con otros productos, consulte previamente al personal competente o a su médico. No realice modificaciones arbitrarias en el producto, ya que de lo contrario no ejercerá el efecto esperado o tendrá un efecto perjudicial para la salud. En estos casos no se asumirá ningún tipo de garantía ni responsabilidad
- Evite que el producto entre en contacto con pomadas, lociones o ungüentos que contengan grasas o ácidos.
- Todos los productos ortopédicos externos para el cuerpo pueden generar, si están demasiado ajustados, presión local o rara vez, constricción en los vasos sanguíneos o nervios subyacentes. ¡Por favor, evite colocar la cinta demasiado apretada!
- Si al utilizar el producto detecta la aparición de cambios o un aumento de las molestias, interrumpa inmediatamente su uso y consulte a su médico.

Contraindicaciones

Hasta la fecha no se han constatado efectos secundarios por hipersensibilidad. En el caso de presentarse alguno de los cuadros clínicos que se indican a continuación, deberá consultar a su médico antes de utilizar el producto:

- Enfermedades cutáneas, lesiones en la zona correspondiente del cuerpo, especialmente inflamaciones. También cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y temperatura elevada.
- arices (varicosis)
- Alteraciones en la sensibilidad del brazo debido a trastornos neurológicos
- Trastornos circulatorios del brazo (p. ej. con diabetes mellitus)
- Trastornos del flujo linfático e hinchazón de partes blandas de origen incierto

Indicaciones de uso

Colocación y retirada de la ortesis OrthoPrax Wrist Brace 3807

1. Afloje el velcro y abra bien la ortesis.
2. Coloque la mano en la ortesis hasta la correa del pulgar.
3. Apriete la cinta de los cordones y ciérrela con el velcro de la ortesis.
4. Vuelva a apretar la correa del pulgar si es necesario.

Indicaciones para la limpieza

Lave el producto a mano. No exponga nunca el producto a fuentes de calor / frío directas. Respete también los símbolos de lavado que figuran en las instrucciones de uso.

Indicaciones para el personal competente

Antes de colocarla, compruebe el ajuste de las férulas metálicas y ajústelas si es necesario. Asegúrese de que el ángulo de la articulación del pulgar es correcto y de que se ajusta a la férula interior. Instruya al paciente sobre la correcta colocación de la ortesis.

Indicaciones sobre su reutilización

El producto está destinado al tratamiento individual de un paciente.

Garantía

Serán aplicables las disposiciones legales del país en el que se haya adquirido el producto. Por favor, en caso de reclamaciones de garantía, dirijase directamente al punto de venta donde haya adquirido el producto. El producto debe limpiarse antes de entregarse para la prestación de los servicios en garantía. No respetar las indicaciones sobre el uso y el cuidado de OrthoPrax Wrist Brace 3807 puede afectar o excluir la garantía.

Queda excluida la garantía en caso de:

- Uso no conforme al indicado
- No seguir las indicaciones del personal competente
- Realizar cambios arbitrarios en el producto

Obligación de informar

De conformidad a las normas legales regionales vigentes, usted tiene la obligación de informar inmediatamente sobre cualquier hecho grave aparecido durante el uso de este producto médico tanto al fabricante como a las autoridades competentes. Encontrará nuestros datos de contacto en el reverso del folleto del producto.

Eliminación

Al final de la vida útil, deseche el producto conforme a las normativas locales al respecto.

Combinación de materiales

Nylon; Poliéster (PES); Aluminio (Al); espuma de PU

 – Medical Device (Dispositivo médico)

 – Distintivo de la matriz de datos como UDI

* Se considera personal competente a toda aquella persona que, conforme a la normativa estatal aplicable, esté autorizada para adaptar vendajes y ortesis e instruir sobre su uso.

Size	inches	cm
S-M	4¾-7	12-18
L-XL	7-10¾	18-26



CONTACTS

USA

Bauerfeind USA, Inc.

75 14th St NE

Suite 2350

Atlanta, GA 30309

P+1 800 423-3405

P+1 404 201-7800

F +1 404 201-7839

E info@bauerfeindusa.com

All instructions for use:

<http://www.orthopraxmedical.com/downloads>

 **Span Link International LLC**

28 west Jefryn Blvd.

11729 Deer Park, NY

United States